

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Skripsi, Februari 2023

**Julidan Ade Pangestu<sup>1</sup>, dr. Andi Tenri Padad, M.Med, Ed, Sp.KJ<sup>2</sup>**

**<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas  
Muhammadiyah Makassar Angkatan 2017/ Email :**

**[Julidanadepangestu07@gmail.com](mailto:Julidanadepangestu07@gmail.com)**

**<sup>2</sup>Pembimbing**

**ABSTRAK**

**Latar Belakang :** Perundungan adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seorang individu atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan merasa tak berdaya. Depresi adalah gangguan mental umum yang ditandai dengan perubahan mood yang depresif, seperti kehilangan minat atau kesenangan, kurang energi, merasa bersalah atau merasa tak percaya diri, gangguan tidur, nafsu makan menurun dan sulit berkonsentrasi. Dalam penelitian terdahulu pengalaman perundungan diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya depresi, yang dimana terdapat korelasi yang signifikan antara perundungan dan depresi pada remaja

**Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya hubungan antara pengalaman perundungan dengan tingkat depresi dan seberapa besar pengaruh yang dapat terhadap depresi yang dialami oleh remaja dewasa

**Metode :** Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian *Cross Sectional*. Penelitian *Cross Sectional* adalah pengukuran variabel bebas dan variabel terikat yang dilakukan secara atau waktu yang bersamaan dan dilakukan dengan satu kali pengukuran. Pengumpulan sampel yang digunakan yaitu *convenience sampling*.

**Hasil :** Berdasarkan hasil uji *Chi-Square* antara pengalaman perundungan terhadap depresi didapatkan hasil 0,000 ( $<0,05$ ) serta terdapat hasil uji *Risk Estimate* yang bernilai 4,288

**Kesimpulan :** Terdapat adanya hubungan antara pengalaman perundungan dengan depresi yang ditandai dengan hasil uji *Uji Chi-Square* yang didapatkan yaitu 0,000 ( $<0,05$ ) serta pengalaman tersebut memiliki pengaruh yang dimana orang yang memiliki depresi beresiko mengalami pengalaman perundungan 4,288 kali dibandingkan orang yang tidak memiliki depresi sama sekali.