

**Hardianti
Sumarni**

**HUBUNGAN ANTARA PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DALAM
RAHIM DENGAN KEJADIAN KEPUTIHAN DI PUSKESMAS MINASA
UPA MAKASSAR**

xi+57 halaman+6 tabel+1 gambar+6 lampiran

ABSTRAK

LATAR BELAKANG : Alat kontrasepsi dalam rahim memiliki keunggulan yaitu penggunaan jangka panjang, kontrol medis yang ringan dan efektivitasnya cukup tinggi. Namun penggunaan kontrasepsi AKDR juga mempunyai risiko terjadinya efek samping dan komplikasi yang terjadi, salah satunya terjadinya keputihan.

TUJUAN PENELITIAN : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan penggunaan AKDR terhadap kejadian keputihan di Puskesmas Minasa Upa Makassar.

METODE PENELITIAN : Penelitian cross sectional dengan teknik *simple random sampling*. Besar sampel 97 pasien. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dengan analisa data menggunakan analisis *Chi square*.

HASIL : Terdapat hubungan yang signifikan secara statistik pasien yang menggunakan AKDR dan mengalami keputihan berjumlah 64 orang (66,0%) dan yang tidak mengalami keputihan berjumlah 5 orang (5,2%), sedangkan pasien yang tidak menggunakan AKDR dan mengalami keputihan berjumlah 11 orang (11,3%) dan yang tidak mengalami keputihan berjumlah 17 orang (17,5%).

KESIMPULAN : Terdapat hubungan antara penggunaan alat kontrasepsi dengan kejadian keputihan di Puskesmas Minasa Upa Makassar yang signifikan.

Kata Kunci : Alat Kontrasepsi Dalam Rahim, Keputihan

**Hardianti
Sumarni**

**THE ASSOCIATION BETWEEN THE USE OF INTRAUTERINE DEVICE
AND THE INCIDENCE OF VAGINAL DISCHARGE IN THE
COMMUNITY HEALTH CENTER OF MINASA UPA MAKASSAR**

xi+56 pages+6 tables+1 pictures+6 attachments

ABSTRACT

BACKGROUND : Intrauterine device have benefits such as long-term used mild medical control and effectiveness is high enough. But the use of Intrauterine device also have the risk of side effects and complications, one only the vaginal discharge.

OBJECTIVE : To know whether there is a association between the use of Intrauterine Device with vaginal discharge in Community Health Centre of Minasa Upa Makassar.

METHODS : Cross sectional research technique with *simple random sampling*. Sample size 97 patients. The types of data that is used with the analysis of secondary data with analysis of the data using the *Chi square*.

RESULTS : Find out the association in patients who use Intrauterine Device statistic and experience the vaginal discharge numbered 64 people (66.0%) and who do not experience vaginal discharge numbered 5 people (5.2%), while patients who do not use Intrauterine Device and experience the vaginal discharge numbered 11 people (11.3%) and who do not experience vaginal discharge numbered 17 people (17.5%).

CONCLUSION : There is a associaton between the use of Intrauterine Device and incedence of vaginal discharge in Community Health Centre of Minasa Ipa Makassar.

Key Words : Intrauterine Device, vaginal Discharges