

DHIA FALIH ANNISA, NIM 10542 060015

**INISIASI POSTNATAL CARE DINI TERHADAP ANGKA KESAKITAN FISIK IBU PASCA MELAHIRKAN DI PUSKESMAS KOTA MAKASSAR**  
(vi+61 halaman, 4 tabel, 2 gambar, 10 lampiran)

**ABSTRAK**

**Latar Belakang:** Penyebab kematian ibu post partum di Indonesia dikarenakan oleh infeksi dan pendarahan pervaginam. Semua itu dapat terjadi, jika ibu post partum tidak mengetahui tanda bahaya selama masa nifas. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang masalah informasi yang diperoleh ibu nifas kurang. Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai standar, yang dilakukan sekurang-kurangnya tiga kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada enam jam sampai dengan tiga hari pasca persalinan, pada hari ke empat sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan.

**Tujuan Penelitian:** Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara inisiasi Postnatal Care dengan tingkat kesakitan fisik ibu setelah melahirkan.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik dengan pendekatan *Cross-Sectional*. Total responden dalam penelitian ini adalah 81 responden. Sampel yang digunakan adalah semua ibu nifas yang melakukan kunjungan nifas paling lama 3 bulan setelah melahirkan di beberapa puskesmas wilayah kota Makassar. Metode pengumpulan data menggunakan metode pengisian daftar tilik (*Check List*) dan wawancara. Data diolah menggunakan Uji *Chi-Square*.

**Hasil:** Sebanyak 69% ibu nifas yang mempunyai jarak kelahiran kurang dari 2 tahun mengalami kejadian infeksi masa nifas dan sebanyak 71,6% ibu nifas yang telat melakukan kunjungan Postnatal care juga mengalami kejadian infeksi masa nifas.

**Kesimpulan:** Kurangnya monitoring Ibu nifas terbukti berhubungan dengan kejadian morbiditas nifas karna pelayanan Postnatal care dapat memonitor keluhan atau kejadian morbiditas ibu sehingga dengan monitoring atau pelayanan Postnatal Care yang baik dapat dideteksi morbiditas atau angka kesakitan fisik ibu lebih banyak

**Kata Kunci:** *Postnatal Care, morbiditas, ibu nifas, mortalitas, kunjungan nifas, kesakitan fisik masa nifas*

**DHIA FALIH ANNISA, NIM 10542 060015**

**THE INITIATION OF EARLY POSTNATAL CARE TOWARDS THE  
POSTPARTUM MOMENT OF PHYSICAL ILLNESS IN PUBLIC  
HEALTH CENTRE OF MAKASSAR**

(vi+61 pages, 4 tables, 2 pictures, 10 appendices)

**ABSTRACT**

**Background:** The cause of death of post partum mothers in Indonesia is caused by infection and vaginal bleeding. All that can happen, if the post partum mother does not know the danger signs during the puerperium. This is caused knowledge about the problem of information obtained by postpartum mothers is less. Postpartum maternal health services are health services for postpartum mothers according to standards, which are carried out at least three times according to the recommended schedule, at six hours up to three days postpartum, on the fourth day to the 28th day after postpartum, and on the 29th day to 42nd day postpartum.

**Purpose:** To knowing there is a relation between Postnatal Care initiation and the level of mother's physical illness the after postpartum.

**Method:** This research used an observational analytic research design with a Cross-Sectional approach. The total respondents in this research are 81 respondents. The sample used was all postpartum mothers who had postpartum visits at least 3 months after giving birth in several health centers in the city of Makassar. The method of data collection uses the method of filling in the checklist and interviews. Data is processed using the Chi-Square Test.

**Result:** As many as 69% of postpartum mothers who have birth spans of less than 2 years have the postpartum infection and as many as 71.6% of postpartum mothers who are late for a postnatal care initiation also have the postpartum infection.

**Conclusion:** Lack of monitoring of postpartum mothers has been shown to be related with the incidence of puerperal morbidity because Postnatal care services can monitor complaints or the incidence of maternal morbidity so that monitoring or postnatal care services can better detect morbidity or maternal physical morbidity

**Key words:** *Postnatal Care, morbidity, postpartum mothers, mortality, postpartum visits, postpartum physical illness.*